OUTIL N°3

OBSERVER UN RÉFLEXE SPINAL DE GALANT PERSISTANT



Descriptif des signes observables

Au niveau corporel

- ❑ Rotation d'une hanche lors de la marche.
- ❑ Mauvais contrôle de la vessie ; besoin fréquent d'aller aux toilettes.
- ❑ Énurésie nocturne (et parfois diurne).
- ❑ Scoliose au niveau de la colonne vertébrale.
- ❑ Maux de dos fréquents.
- ❑ Ne supporte pas la présence de personnes derrière lui·elle.
- ❑ Besoin constant de bouger.
- ❑ Préférence pour s'installer au sol ou debout, plutôt qu'en position assise.

Au niveau psychomotricité fine

- ❑ Manipulation maladroite des objets.

Au niveau coordination

- ❑ Difficultés de coordination dans les mouvements habituels de la marche.
- ❑ Problèmes d'attention ou de concentration.

Au niveau des sens

- ❑ Gêne liée au dossier « fermé » d'une chaise ou dont l'ouverture inférieure touche le bas du dos.
- ❑ Sensibilité accrue à l'environnement (mouvements, contacts, proximité physique).
- ❑ Ne supporte pas les vêtements trop serrés à la taille.
- ❑ Manque de fluidité ou de mobilité lors d'activités sportives.

Au niveau global et émotionnel

- ❑ Incapacité à rester en place.
- ❑ Élève qualifié d'hyperactif·ve (alors qu'il s'agit souvent d'un réflexe non intégré).
- ❑ Réactions émotionnelles parfois rapides ou intenses (surprises, contrariétés, frustrations).
- ❑ Besoin important de contrôler l'espace autour de soi ou de tenir les autres à distance (lié à l'hypersensibilité du bas du dos).
- ❑ Variabilité notable de l'attention selon la posture et l'environnement immédiat.

Cocher les cases des situations observées

© Éditions Atzéo - Matériel à ne pas diffuser sur les réseaux sociaux.